

Antidol®



CLASE FARMACOLÓGICA.

Paracetamol. Código ATC: N02BE01

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto desarrollado con tecnología **EASY-SWALLOW** para una fácil deglución contiene paracetamol 1.000 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido recubierto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Analgésico, antipirético.

PROPIEDADES.

Antidol® es un medicamento con propiedades analgésicas y antipiréticas. Combate el dolor leve a moderado y es muy eficaz contra la fiebre, actuando sobre el centro hipotalámico cerebral regulador de la temperatura corporal.

La tecnología de recubrimiento **EASY-SWALLOW** facilita la deglución, porque mejora drásticamente el movimiento de deslizamiento del comprimido, reduciendo significativamente la probabilidad de que se pegue en la garganta o el esófago.

INDICACIONES.

Antidol® está indicado en adultos y adolescentes a partir de 15 años con un peso superior a 50 kg para el tratamiento sintomático de dolores agudos y crónicos, leves a moderados asociados a múltiples causas tales como cefalea, migraña, dolor posquirúrgico en ortopedia, odontalgia, dolor articular, dolor muscular, lumbalgia, síndromes febriles de diferente origen, síndrome premenstrual, dolores ginecológicos.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Como posología de orientación se sugiere administrar 1 comprimido cada 8 a 12 horas. No exceder los 3.000 mg/día.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Antidol® es un medicamento bien tolerado y no es tóxico a dosis terapéuticas. Raramente se ha reportado la aparición de náuseas, vómitos, dolor epigástrico, somnolencia, ictericia, anemia hemolítica, daño renal y hepático o neumonitis.

SOBREDOSIS.

Paracetamol puede causar toxicidad hepática, aunque raras veces se ha informado con dosis menores de 10 g. Se puede presentar náuseas, vómitos y dolor abdominal dentro de 2 a 3 horas después de la ingestión de una sobredosis. El paciente debe ser llevado a un centro médico para diagnóstico y tratamiento de la sintomatología. Si la ingestión es reciente, se debe inducir al vómito o realizar lavado gástrico. Administración de carbón activado y/o acetilcisteína.

CONTRAINDICACIONES.

Antidol® está contraindicado en pacientes alérgicos a paracetamol o a AINEs. Debido a que se metaboliza en el hígado, se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático, o pacientes que sufran de nefropatía.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Aunque es el analgésico de elección para embarazadas, pues no existe evidencia concluyente de que cause malformaciones o toxicidad fetal, se recomienda administrar con precaución y usar la dosis mínima efectiva y durante el menor tiempo posible. No se han reportado efectos adversos de los lactantes cuando las madres usan el medicamento en dosis terapéuticas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No administrar de forma conjunta con alcohol, anticoagulantes orales, anticonceptivos orales, otros analgésicos y antiinflamatorios, fenobarbital, cloranfenicol, anticolinérgicos, propranolol, metoclopramida, probenecid, colestiramina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

En caso de una reacción de sensibilidad discontinuar el medicamento. No ingerir el medicamento juntamente con alcohol. En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, afecciones cardíacas o pulmonares, asmáticos. No exceder la dosis recomendada. No administrar simultáneamente con otro producto que contenga paracetamol.

Limitar el uso de paracetamol con anticonvulsivantes, el uso concomitante de ambos potencia la hepatotoxicidad y disminuye la biodisponibilidad de paracetamol.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento. Consultar con su médico si no advierte mejoría. Venta libre. No contiene gluten.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contactarnos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

Estuche x 30 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fardoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.



02/25 V.00

breskotpharma.com

