

CortaGrip®

Jarabe - Solución oral



CLASE FARMACOLÓGICA.

Paracetamol, combinaciones excluido psicolépticos.
Codigo ATC: N02BE51

COMPOSICIÓN.

Jarabe: Cada 5 mL contiene paracetamol 125 mg, pseudoefedrina HCl 30 mg, clorfeniramina maleato 2 mg, excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, glicerina, sorbitol, otros c.s.

Solución oral: Cada mL (26 gotas) contiene paracetamol 120 mg, pseudoefedrina HCl 7,5 mg, clorfeniramina maleato 0,75 mg, excipientes: benzoato de sodio, propilenglicol, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Jarabe.
Solución oral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antipirético, analgésico, descongestionante nasal.

PROPIEDADES.

Paracetamol posee acción antipirética y analgésica, inhibe la síntesis de prostaglandinas en el SNC y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

Pseudoefedrina posee acción descongestionante vasoconstrictora, aumenta la permeabilidad de las vías respiratorias nasales, facilita el drenaje de las secreciones de los senos nasales y permite la apertura de los conductos obstruidos de las trompas de Eustaquio.

Clorfeniramina es un antialérgico, que reduce el enrojecimiento, la picazón y el lagrimeo de ojos, estornudos, irritación nasal y de garganta, secreción nasal.

INDICACIONES.

CortaGrip® está indicado para estados gripales virales asociados a fiebre, resfrió común, rinitis alérgica, rinosinusitis infecciosa.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Como posología de orientación se aconseja:

Jarabe:

Niños de 2 a 6 años: 5 mL cada 6 a 8 horas.
Niños de 7 a 12 años: 7,5 mL cada 8 a 12 horas.
Mayores de 12 años y adultos: 10 mL cada 6 a 8 horas.

Solución oral:

Niños de 2 a 6 años: 2 gotas kg/peso cada 6 a 8 horas.
Niños de 7 a 12 años: 36 gotas cada 8 a 12 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

El medicamento generalmente es bien tolerado, podría ocasionar: Erupciones cutáneas, sequedad bucal, náuseas, vómitos o diarrea, arritmia cardíaca, palpitaciones, cansancio, somnolencia, visión borrosa.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Insuficiencia hepática y renal severa. No administrar en niños menores de 2 años.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, ergotamina, isoniazida, inhibidores de la MAO, heparina, adrenalina, antihipertensivos, ansiolíticos, alfa y betabloqueadores, depresores del SNC.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Se aconseja emplear con precaución en pacientes con sensibilidad al paracetamol o riesgo de hepatotoxicidad, síndrome de Reye. Asma. Pacientes con hipersecreción mucosa respiratoria debido a una elevación del espesamiento de secreciones bronquiales por contener un antihistamínico.

Benzoato de sodio puede irritar ligeramente los ojos, piel y mucosas. Puede aumentar el riesgo de ictericia en recién nacidos. Sorbitol puede causar molestias gastrointestinales; no debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa. Glicerina puede provocar dolores de cabeza, molestias en el estómago y diarrea. Propilenglicol puede causar efectos adversos sobre el SNC, somnolencia, puede afectar la capacidad de manejar maquinaria y/o vehículos.

SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis acudir al centro médico más cercano. En caso de exceder las dosis recomendadas pueden aparecer síntomas como calambres, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y convulsiones. Si el medicamento ha sido ingerido recientemente, la administración de carbón activado puede reducir la absorción de paracetamol.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar después de la fecha de vencimiento.
Consultar con su médico si no advierte mejoría.
Medicamento de venta libre.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al cliente: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Jarabe: Frasco x 100 mL

Solución oral: Frasco gotero x 15 mL



BRESKOT
Pharma

SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fermoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA), Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras. Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.



SIG

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



06/23



breskotpharma.com