

DOLOCOFAMIN® 5% GEL

**VENTA
LIBRE**

CLASE FARMACOLÓGICA.

Diclofenaco. Código ATC: D11AX18

COMPOSICIÓN.

Cada 100 g contiene diclofenaco sódico 5 g (5%), equivalente a diclofenaco dietilamino 5,8 g, excipientes: transcutol P, mentol, propilenglicol, alcohol bencílico, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Gel.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Analgésico, antiinflamatorio.

PROPIEDADES.

DOLOCOFAMIN®GEL 5% contiene diclofenaco, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antirreumáticas, que se presenta en una concentración al 5% para obtener un máximo efecto contra el dolor y la inflamación.

La tecnología hidroliposoluble aplicada en DOLOCOFAMIN®GEL 5% utiliza transcutol P para potenciar la penetración transdérmica de diclofenaco, garantizando un mayor y más rápido efecto localizado.

Mentol es un antiséptico, analgésico, antiinflamatorio, rubefaciente y antipruriginoso, actúa sobre los receptores del frío en la superficie de la piel, generando una sensación de alivio refrescante.


INDICACIONES.

DOLOCOFAMIN®GEL 5% está indicado para el alivio local del dolor y de la inflamación de origen reumático o traumático en articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Puede ser utilizado conjuntamente con cápsulas de DOLOCOFAMIN®3B por vía oral.


También indicado para el tratamiento tópico de la queratosis actínica.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.


La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como posología de orientación se aconseja cada 6 a 8 horas.



Lavar con agua y jabón, secar bien el área afectada.



Dosificar la cantidad suficiente para el área afectada.



Aplicar con un masaje suave para facilitar la absorción.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

En general es bien tolerado, puede producirse erupción cutánea, enrojecimiento o escozor en el lugar de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

No aplicar en lugares de la piel donde existan cortes, heridas abiertas, erupciones o eczemas, ni en las mucosas. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurriera lavar los ojos con abundante agua. No aplicar simultáneamente en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos. Evitar la exposición al sol de las zonas tratadas. Medicamento de uso externo, no ingerir. Propilenglicol y alcohol bencílico puede producir irritación en la piel.

SOBREDOSIS.

No se han documentado casos de sobredosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No se han descrito interacciones de orden farmacológico.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento. Consultar con su médico si no advierte mejoría. Venta libre.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Tubo x 60 g



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fermoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.

