

Baxor®



CLASE FARMACOLÓGICA.

Rivaroxabán. Código ATC: B01AF01.

COMPOSICIÓN.

	comprimido recubierto		comprimido ranurado recubierto
	Baxor®10	Baxor®15	Baxor®20
Rivaroxabán	10 mg	15 mg	20 mg
	excipientes c.s.	excipientes c.s.	excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Agente anticoagulante, antitrombótico, inhibidor del factor Xa altamente selectivo.

INDICACIONES.

Baxor® está indicado para la prevención de apoplejías o coágulos de sangre graves. Prevención de accidente cerebro vascular (ictus) y embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular (FA) no valvular y con uno o más factores de riesgo. Tratamiento de tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de las extremidades inferiores y embolia pulmonar. Tratamiento de trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP).

POSEOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja 1 comprimido cada 24 horas en los siguientes casos: Baxor®10 para la prevención del TEV en intervenciones quirúrgicas ortopédicas mayores. Baxor®15 para la prevención de tromboembolismo en pacientes con insuficiencia renal. Baxor®15 y Baxor®20 para la prevención del Accidente Cerebro Vascular en fibrilación auricular y embolia sistémica. La dosis máxima diaria recomendada es de 20 mg. Por el riesgo de formación de coágulos, no se debe interrumpir el tratamiento sin previa consulta al médico tratante.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Sangrado prolongado o excesivo después de cirugías. Disminución de los glóbulos rojos, debilidad, cansancio, palidez, mareos, cefalea, náuseas; hemorragia gástrica, intestinal, ginecológica o nasal. Sangrado hacia un tejido o cavidad del organismo (hematomas, moretones). Sangre en orina. Secreción de sangre en herida quirúrgica. Aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial baja, dolor de estómago, indigestión, estreñimiento, diarrea. Dolor en las extremidades. Erupción cutánea, prurito. Alteración de la función renal. Los análisis de sangre muestran un aumento de la bilirrubina, de algunas enzimas pancreáticas y/o del número de plaquetas.

SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis o ingesta accidental acudir al servicio de urgencia más cercano. No existe un tratamiento específico en el caso de sobredosis. Se pueden dar complicaciones hemorrágicas. Tratamiento sintomático, instituir las medidas de soporte necesarias. Considerar el uso de carbón activado.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Hemorragia activa clínicamente significativa. Contraindicado tras una intervención de fractura de cadera en caso de sangrado excesivo, enfermedades neoplásicas y hepáticas que aumenten el riesgo de sangrado.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Contraindicado durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Interactúa con medicamentos como anagrelide, ASA y otros AINEs como ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno y naproxeno; eritromicina; cilostazol; clopidogrel, dipiridamol, eftifibatida, heparina, prasugrel, ticagrelor; ticlopidina; tirofiban y warfarina. Antiinfecciosos, antivirales y antiepilépticos, hierba de San Juan (medicamento a base de plantas para el tratamiento de la depresión), rifampicina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Enfermedades del hígado que aumenten el riesgo de sangrado requieren cuidados especiales. Es muy importante tomar rivaroxabán antes y después de la inyección o de la extracción del catéter, exactamente a las horas en que el médico lo indique. Informar inmediatamente al médico si presenta adormecimiento o debilidad en las piernas, problemas en el intestino o en la vejiga al final de la anestesia.

Si se administra anestesia epidural o espinal durante el tratamiento con rivaroxabán existe el riesgo de formación de un coágulo en la columna o alrededor, el cual podría causar una parálisis. Informar al médico si se tiene un catéter epidural en el cuerpo o si se tiene o se ha tenido punciones epidurales o espinales, deformidad espinal o cirugía espinal.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica. No usar después de la fecha de vencimiento. No recomende este medicamento a otra persona. No contiene gluten. "Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas". Contáctenos a través de las líneas gratuitas. Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222 Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

Baxor®10 estuche x 8 comprimidos
Baxor®15 y Baxor®20 estuche x 21 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA) Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras. Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos la seguridad y salud en el trabajo, el cuidado del medio ambiente y la bioseguridad.



breskotpharma.com

