

# COFARGOT® FORTE



## CLASE FARMACOLÓGICA.

Ergotamina, combinaciones. Excluye psicodélicos. Código ATC: N02CA52.

## COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene ergotamina tartrato 1 mg, paracetamol 650 mg, cafeína 100 mg, excipientes c.s.

## FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido recubierto.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antimigrañoso.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

## INDICACIONES.

COFARGOT®FORTE está indicado en el tratamiento de cuadros establecidos de migraña con y sin aura. En ataque de dolor de cabeza agudo pulsátil unilateral conocido como cefalea histamínica o síndrome de Horton.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja tomar 2 comprimidos al iniciarse los síntomas, si al cabo de 30 minutos no ha cedido el cuadro, tomar 1 comprimido adicional. **No ingerir más de 4 comprimidos en 24 horas ni 10 comprimidos en una semana.**

COFARGOT®FORTE es más efectivo cuando se administra apenas se perciban indicios del ataque migrañoso.

## EFFECTOS SECUNDARIOS.

En pacientes susceptibles se podría presentar hormigueo, adormecimiento, ardor en la piel, frialdad de manos y pies, dolor y debilidad en brazos y piernas, somnolencia, náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, hinchazón de la cara, dificultad para respirar, aumento de la presión sanguínea y alteraciones hematológicas, como disminución del número de glóbulos blancos (neutropenia o leucopenia). Con dosis altas o tratamientos prolongados puede observarse trastornos de la función del hígado.

## SOBREDOSIS.

Si se ha ingerido una sobredosis de ergotamina, más de 10 comprimidos en 7 días, acudir a un centro médico por riesgo de ergotismo, aunque no existan síntomas. Los síntomas pueden ser muy graves y se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de la sobredosis: ausencia de pulsos, desmayos, vómitos, parestesias. Puede añadir un cuadro de isquemia periférica, que deberá tratarse con vasodilatadores periféricos, aplicación de calor local en la zona afectada y heparina. El consumo superior a 4 g de paracetamol en 24 horas puede dañar el hígado. El carbón activado disminuye la absorción de paracetamol en 90%.

## CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Sepsis, disfunción vascular obstructiva, disfunción vascular periférica. Enfermedad coronaria e hipertensión severa. Hepatopatías. Insuficiencia renal. Arteritis temporal. Migraña hemipléjica o basilar.

## EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No se recomienda su uso concomitante con otros preparados con ergotamina, sumatriptán, naratriptán, almotriptán, amprenavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir, efavirenz, eritromicina, claritromicina y azitromicina, que se metabolizan por la misma vía del citocromo P-450 (CYP 3A4), dado que puede favorecer la aparición de cuadros de ergotismo. Al inhibirse la vía de metabolización de ergotamina, se elevan los niveles séricos con el riesgo de ocasionar vasoconstricción y consecuentemente isquemia en extremidades e isquemia cerebral.  $\beta$ -bloqueantes (nadolol, oxprenolol, propranolol, timolol), dopamina, cloranfenicol.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Precaución en pacientes que consumen medicamentos hepatotóxicos o inductores de las enzimas hepáticas. Puede provocar asma.

Indicado únicamente para el tratamiento de las crisis y no como tratamiento profiláctico. Debe evitarse el uso continuado a dosis superiores a las recomendadas. Por el contenido de ergotamina se recomienda precaución en pacientes geriátricos. No recomendado en menores de 12 años.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento. Venta bajo receta médica. No contiene gluten.

“Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contactarnos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

## PRESENTACIÓN.

Estuche x 100 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia  
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

**Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.**



breskotpharma.com

