

Dolocofamin® B12

Dolocofamin® B12 Forte

CLASE FARMACOLÓGICA.

Diclofenaco, combinaciones. Código ATC: M01AB55

COMPOSICIÓN.

DOLOCOFAMIN®B12

Cada ampolla x 3 mL contiene:

Diclofenaco sódico 75 mg

Vitamina B12 10.000 µg

DOLOCOFAMIN®B12 FORTE

Cada ampolla x 3 mL contiene:

Diclofenaco sódico 75 mg

Vitamina B12 25.000 µg

Excipientes: Alcohol bencílico, propilenglicol, metabisulfito de sodio, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Solución inyectable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

I.M. profunda.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antineurítico, antiinflamatorio y analgésico.

INDICACIONES.

DOLOCOFAMIN®B12 y DOLOCOFAMIN®B12 FORTE están indicados en enfermedades reumáticas inflamatorias: Artritis, gota, osteoartritis, espondilitis anquilosante, bursitis, tendinitis. Dolores músculo esqueléticos asociados a inflamación. Afecciones degenerativas del raquis. Ciática. Lumbalgia. Neuritis de diversa etiología. Radiculitis. Herpes Zóster. Dolores neurálgicos, parestia facial, neuralgia del trigémino, síndrome hombro mano, neuralgia intercostal. Dolores postraumáticos, lesiones músculo esqueléticas.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja: 1 ampolla de DOLOCOFAMIN®B12 o DOLOCOFAMIN®B12 FORTE cada 24 horas por 1 a 3 días, vía intramuscular profunda, preferentemente intraglútea.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

En general es bien tolerado. En personas hipersensibles se han observado molestias gastrointestinales, leves leucopenias, fatiga, insomnio, que habitualmente remiten al finalizar la administración del medicamento.

SOBREDOSIS.

No se han descrito casos de sobredosificación.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Policitemia vera, asma, úlcera gástrica.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Alcohol, corticosteroides, corticotropina y suplementos de potasio. Anticoagulantes cumarínicos, heparina y agentes trombolíticos. Agentes antiidiabéticos orales o insulina. Cefoperazona y ácido valproico. Colchicina. Ciclosporina y sales de oro. Digitálicos. Litio. Metotrexato.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Controlar la administración en pacientes con trastornos hematopoyéticos, enfermedades gastrointestinales o cardiovasculares. Metabisulfito de sodio puede causar reacciones de tipo alérgico. Alcohol bencílico está contraindicado en niños menores de tres años. Por contener propilenglicol puede causar somnolencia que afecta la capacidad de manejar herramientas, maquinaria y/o vehículos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

No administrar después de la fecha de vencimiento.

“Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

DOLOCOFAMIN®B12 caja x 10 estuches unidosos con jeringa

DOLOCOFAMIN®B12 FORTE caja x 10 estuches unidosos con jeringa



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia. Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG); Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178), Operador Económico Autorizado (OEA). Operaciones Bioseguras. Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.



11/23



breskotpharma.com