

NOVADOL® 75



CLASE FARMACOLÓGICA.

Diclofenaco, combinaciones. Código ATC: M01AB55

COMPOSICIÓN.

Cada cápsula contiene diclofenaco gastrorresistente 75 mg, paracetamol DC 500 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Cápsula.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiinflamatorio, analgésico.

PROPIEDADES.

La combinación de diclofenaco y paracetamol generan una sinergia de efecto analgésico - antiinflamatorio con un inicio de acción en los primeros 15 minutos después de la administración. Contiene microgránulos de diclofenaco gastrorresistente, que mejoran la tolerancia en pacientes con antecedentes gastrointestinales; paracetamol en su presentación DC favorece la rápida absorción. La presentación en cápsula mejora la biodisponibilidad de los principios activos.

INDICACIONES.

NOVADOL®75 se encuentra indicado en procesos inflamatorios y dolorosos de diversa etiología. Dolor de cabeza. Dolor posquirúrgico, odontalgias, dismenorrea, anexitis, ataques de gota, artritis gotosa, cervicalgias, lumbalgias, ciatalgias, mialgias, esguince, tendinitis, tenosinovitis, dolores leves a moderados en general.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media de orientación se aconseja en mayores de 12 años y adultos 1 cápsula de NOVADOL®75 cada 12 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

El fármaco en general es bien tolerado a dosis terapéuticas. En pacientes hipersensibles pueden presentarse trastornos de carácter leve: epigastralgia, náuseas, diarrea, constipación, cefalea, mareos que desaparecen espontáneamente con la suspensión de la terapia.

SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis acudir al centro médico más cercano.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Úlcera péptica activa, depresión de la médula ósea, insuficiencia hepática, hepatitis viral, disfunción renal severa, alcoholismo, asma, alteraciones gástricas.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Contraindicado durante el embarazo y lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No administrar juntamente con AINEs, anticoagulantes orales, digitálicos, corticoides, suplementos de potasio, aminoglucósidos, alcohol, hipoglucemiantes orales, insulina, antihipertensivos, natriuréticos, fenobarbital, fenitoína, anticonceptivos orales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

No consumir más de 2 cápsulas en 24 horas. En caso de sensibilidad gastrointestinal o hepática no utilizar el fármaco por más de 5 días consecutivos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C y protegido de la humedad en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No contiene gluten. No usar después de la fecha de vencimiento. Venta bajo receta médica.

“Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contactarnos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

Estuche x 120 cápsulas



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.



01/25 V.00



breskotpharma.com