

# OxAR®20 OxAR®40

## CLASE FARMACOLÓGICA.

Olmesartán medoxomil. Código ATC: C09CA08

## COMPOSICIÓN.

Cada comprimido ranurado recubierto contiene:

|                      | OxAR®20 | OxAR®40 |
|----------------------|---------|---------|
| Olmesartán medoxomil | 20 mg   | 40 mg   |
| Excipientes c.s.     |         |         |

## FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antihipertensivo. Antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA II).

## INDICACIONES.

OxAR®20 y OxAR®40 están indicados para el tratamiento de hipertensión arterial leve y moderada a severa.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media de orientación se aconseja 1 comprimido de OxAR®20 o de OxAR®40 cada 24 horas, a la misma hora del día con o sin alimentos.

## EFFECTOS SECUNDARIOS.

Puede presentarse hipotensión, mareos, dolor lumbar, bronquitis, inflamación de cara, garganta o lengua, pérdida de peso, dificultad para respirar o tragar, ronquera, aumento de la creatinofosfoquinasa, diarrea, cefalea, hematuria (sangre en la orina), aumento de la glucosa y de los triglicéridos en sangre, síntomas de tipo gripal, faringitis, rinitis y sinusitis. Se observaron elevaciones de las enzimas hepáticas y/o de la bilirrubina sérica con muy poca frecuencia.

## SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis acudir al servicio de urgencia más cercano. Puede presentarse hipotensión y taquicardia; también podría producir bradicardia.

## CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Obstrucción biliar o colestasis. Pacientes menores de 18 años. Insuficiencia renal (I.R.) severa, insuficiencia hepática (I.H.) severa, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular.

## EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Diuréticos, suplementos de potasio, antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs, por ejemplo: ácido acetilsalicílico, inhibidores de la COX-2, como celecoxib), litio. Sustitutos de sal que contengan potasio y/o heparina, suplementos a base de potasio.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Precaución en I.H. leve; en I.H. moderada la dosis máxima será de 20 mg/día. Control de la presión arterial y función renal en pacientes con I.H. Además de I.R. leve a moderada; cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular; insuficiencia cardíaca congestiva grave o enfermedad renal; estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis de la arteria renal de un único riñón funcionante aumentan el riesgo de hipotensión e I.R. Riesgo de hipotensión sintomática en pacientes con disminución de sodio y/o de volumen plasmático. No recomendado en aldosteronismo secundario. Riesgo de enteropatía tipo esprue, se han notificado casos de diarrea crónica grave con pérdida de peso tras pocos meses o hasta años después de haber iniciado el tratamiento. En los pacientes con posible disminución del volumen intravascular, insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática grave se debe iniciar el tratamiento bajo una cuidadosa supervisión médica y se debe considerar la posibilidad de utilizar una dosis inicial más baja. Como consecuencia de la inhibición del sistema renina - angiotensina - aldosterona, pueden anticiparse alteraciones de la función renal en individuos susceptibles tratados con este fármaco.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento. Venta bajo receta médica. No recomendar este medicamento a otras personas.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al cliente: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

## PRESENTACIÓN.

Estuche x 35 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.

**GMP**  
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras. Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.



04/23



breskotpharma.com