

TRASSIL® DUO



CLASE FARMACOLÓGICA.

Paracetamol, combinaciones excluye psicodépticos. Código ATC: N02BE51

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene dexibuprofeno 200 mg, paracetamol DC 500 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.

PROPIEDADES.

TRASSIL®DUO posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. La sinergia generada a través de la combinación de los principios activos provee mayor poder analgésico y antipirético con efectividad terapéutica y seguridad, gracias a la tecnología quiral.

Dexibuprofeno es el quiral de ibuprofeno (enantiómero S(+)). Corresponde a la parte activa pura y efectiva de ibuprofeno. Su efecto duplica al de ibuprofeno, permitiendo reducir en un 50% la concentración del fármaco (200 mg de dexibuprofeno vs 400 mg de ibuprofeno) para obtener un óptimo efecto terapéutico con menores efectos secundarios.

Paracetamol es un analgésico antipirético seguro, que tiene un mecanismo de acción central por inhibición de la ciclooxigenasa 3 (COX-3); a diferencia de otros AINEs, provoca menores efectos gastrotóxicos, a nivel de la función renal y no posee actividad antiagregante plaquetaria.

INDICACIONES.

TRASSIL®DUO está indicado en el dolor de intensidad leve a moderada, dolor articular, de cabeza, dental, menstrual y manejo de la fiebre de diverso origen.

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Como posología se aconseja 1 comprimido de TRASSIL®DUO cada 6 a 8 horas. No exceder 6 comprimidos en 24 horas.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Dexibuprofeno: Por ser el quiral de ibuprofeno, reduce el porcentaje de efectos secundarios a nivel del Sistema Nervioso Central y gastrointestinal. En general y a dosis recomendadas el medicamento es bien tolerado. En algunos casos y en tratamientos prolongados, puede presentarse dispepsia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal.

Paracetamol: A dosis terapéuticas no presenta efectos secundarios.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis o ingesta accidental acudir al servicio de urgencia más cercano.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Diuréticos, ácido acetilsalicílico, corticoides, alcohol, anticoagulantes orales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Precaución en pacientes con antecedentes de úlcera o alteraciones gastrointestinales, pacientes con historial de asma bronquial o enfermedades alérgicas, pacientes con trastornos funcionales renales, hepáticos y cardíacos. No consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en el envase original.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar después de la fecha de vencimiento.

Venta bajo receta médica.

No contiene gluten.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contactémos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

PRESENTACIÓN.

Estuche x 50 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fardoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG); Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Laboratorio de Control de Calidad acreditado según NB-ISO/IEC 17025:2018 (DTA-CET-178). Operaciones Bioseguras Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la salud y seguridad de nuestros colaboradores en el trabajo.



11/24 V.00

breskotpharma.com

